



PLANOS DE VACINAÇÃO E DESPARASITAÇÃO

Os planos de vacinação permitem prevenir a ocorrência de doença ou diminuir a severidade desta, no entanto, para o seu sucesso, é necessário fornecer aos animais boas condições ambientais e nutricionais. Por sua vez, os planos estratégicos de desparasitação melhoram a saúde animal através da prevenção do parasitismo clínico, aumentando a produção e permitindo ainda a redução da contaminação das pastagens por larvas de parasitas.

Actualmente, na Ilha do Pico, verifica-se a existência de um elevado número de animais com problemas reprodutivos, devido à alta prevalência de IBR e BVD. A Rinotraqueíte Infecciosa Bovina (IBR) causa elevadas perdas económicas devido aos surtos de abortos, infertilidade, diminuição da produção, morte devido à forma respiratória da doença em animais de todas as idades e à forma sistémica da doença em vitelos, e ainda ao custo do tratamento devido a infecções bacterianas secundárias. As perdas económicas causadas pelo vírus da Diarreia Bovina Viral (BVD) encontram-se relacionadas com a ocorrência de abortos, nados-mortos, vitelos com deficiências congénitas, aumento da mortalidade neonatal, diminuição do crescimento, infertilidade, mortes devido à Doença das Mucosas e devido ao refugo precoce ou morte dos animais PI's (persistentemente infectados).

Segundo um plano estratégico de vacinação e desparasitação é possível aumentar o rendimento das explorações, evitando produções reduzidas, o elevado número de vacas alfeiras e de inseminações e algumas mortes.

PLANO ESTRATÉGICO

Covexin 8® (vacina contra a enterotoxémia – vulgo “picada”/ “pontada”):

- vitelos nascidos de mães vacinadas devem ser vacinados pela primeira vez com 2 a 3 meses de idade;
- aos animais vacinados pela primeira é necessário administrar duas doses de vacina com 6 semanas de intervalo;
- todos os animais devem receber um reforço vacinal anual, idealmente perto do final do ano (Novembro).

Rispoval 4® (vacina contra IBR, BVD, PI3 e BRSV):

- vitelos nascidos de mães vacinadas devem ser vacinados por volta dos 4 a 5 meses de idade;
- aos animais que são vacinados pela primeira vez é necessário aplicar duas doses de vacina com o intervalo de 3 a 4 semanas;
- para uma protecção completa, os animais devem ser revacinados semestralmente.

Dectomax®, Ivomec®, Eprinex®, Ivertin®:

VACAS ALEITANTES:

- Idealmente os animais devem ser desparasitados duas vezes por ano (sensivelmente perto de Setembro e Março).

VACAS LEITEIRAS:

- Estes animais devem ser desparasitados à secagem, no caso de ser usado um desparasitante injectável. Caso se use o Eprinex® (pour on), as vacas podem ser desparasitadas duas vezes por ano, pois o intervalo de segurança no leite é de zero dias.